




# LISTA DE VERIFICACIÓN DE SÍNTOMAS DE LESIÓN CEREBRAL

GUÍA PARA DETERMINAR CANDIDATOS PARA PRUEBAS OBJETIVAS DE LESIÓN CEREBRAL



FECHA: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_


DOL: \_\_\_\_\_ DOB: \_\_\_\_\_ PT. cell #: \_\_\_\_\_

## CATEGORÍAS PARA CONSIDERAR EL MAPEO CEREBRAL CON QEEG

PRIMER PASO

### I. Mecanismo de lesión Por favor, marque todo lo que corresponda:

- Colisión de vehículos motorizados con daños moderados o más 17+ millas por hora
- No MVC que implica movimientos rápidos o violentos hacia el cuello y/o el cuerpo sin contacto con la cabeza
- Golpe en la cabeza       Exposición a productos químicos nocivos
- Privación de oxígeno       Exposición a la explosión



### II. Pérdida del Conocimiento (LOC):

- La lesión resultó en cualquier documentado (LOC)

### III. Presentación:

- No me siento bien       No siento mi yo habitual

PASO DOS

## QUEJAS SUBJETIVAS DE LESIÓN CEREBRAL DESPUÉS DEL INCIDENTE - LISTA DE SÍNTOMAS

Nota: guía general: muchos síntomas involucran múltiples lóbulos, Por favor, marque todo lo que corresponda:

#### DAÑO DEL LÓBULO FRONTAL

- Distraerse fácilmente
- Depresión
- Disminución del olfato
- Disminución de la capacidad de atención
- Disminución de la capacidad de concentración
- Dificultad con conversaciones y tareas
- Fatiga
- Sentirse frustrado

#### DAÑO DEL LÓBULO PARIETAL

- Confusión
- Dificultad para mantener el enfoque
- Dificultad para realizar múltiples tareas
- Tardar más de lo normal en pensar
- Problemas de búsqueda de palabras

#### DAÑO DEL LÓBULO DEL CEREBELO

- Problemas de equilibrio
- Miedo a caerse
- Sensación de desequilibrio en la ducha
- Mareos
- Náuseas
- Dificultades de transferencia posicional

#### DAÑO EN EL TRONCO ENCEFÁLICO

- Disconjugación ocular
- Disminución del gusto
- Cefaleas

#### DAÑO VESTIBULAR PERIFÉRICO

- Mareos       Zumbido en los oídos
- Sueño interrumpido

#### DAÑO DEL LÓBULO TEMPORAL

- Pérdida de audición
- Problemas de memoria
- Humor
- Inquietud
- Sensibilidad al sonido

#### DAÑO DEL LÓBULO OCCIPITAL

- Visión borrosa
- Dificultad de lectura
- Sensibilidad a la luz

#### DAÑO CEREBRAL LOCALIZADO

- Ansiedad       Cefaleas
- Dolor cervical y espasmos
- Múltiples lesiones neurológicas
- Múltiples lesiones ortopédicas

## CONCLUSIÓN:

Cuando se marca alguna de las categorías anteriores en el PASO UNO y hay CINCO (5) o más quejas subjetivas (síntomas) POST-INCIDENTE marcadas anteriormente, se debe considerar seriamente la realización de una prueba QEEG.

Neuron Connect ayuda a los médicos a diagnosticar a los pacientes que sufren de los síntomas asociados con las lesiones cerebrales, proporciona informes extensos que correlacionan la sintomatología con la búsqueda objetiva de pruebas y diseña planes de rehabilitación para ayudar a los pacientes a aprender a compensar y hacer frente a sus discapacidades de lesión cerebral.

Para encontrar un centro de pruebas de diagnóstico NEURON CONNECT cerca de usted, visite nuestro sitio web en

[www.NEURON-CONNECT.com](http://www.NEURON-CONNECT.com)

Teléfono: [602] 888 -1012 Correo electrónico: BrainTrain@Neuron-Connect.com Fax: [602] 926 - 8333

# Instrucciones Generales: Preparación para su Brain-Map

Con el fin de adquirir la evaluación más precisa posible durante su qEEG, siga las siguientes pautas:

- Si es posible, no tome ningún medicamento estimulante durante 48 horas antes de su qEEG.
- Si bien no es necesario que suspenda ningún otro medicamento antes de su visita, asegúrese de traer información sobre el tipo de medicamento y la dosis para dársela a que el técnico registre antes de realizar el qEEG.
- Aunque no necesita suspender ningún otro medicamento antes de su visita, asegúrese de traer información sobre el tipo de medicamento y la dosis que debe administrar al técnico antes de realizar el qEEG.
- Evite tomar medicamentos o suplementos de venta libre como aspirina, antihistamínicos, ibuprofeno, Tylenol, aerosoles nasales, medicamentos para la tos, medicamentos para la alergia, analgésicos, hierbas, suplementos dietéticos o aminoácidos el día de la consulta.
- Si está enferma, llame para reprogramar.
- No beba ninguna sustancia con cafeína menos de 4 horas antes del qEEG.
- Coma al menos una hora antes de su sesión y beba mucha agua durante todo el día antes de la grabación de qEEG para hidratar la piel.
- Asegúrese de dormir bien por la noche antes de hacer el qEEG. (Informe a los técnicos si ha habido algún trastorno del sueño).
- No fume la mañana de la sesión.
- Sin alcohol 3 días antes de su sesión.
- Sin marihuana 72 horas antes de su sesión.
- Si tiene extensión de cabello o cualquier herida abierta en la cabeza / cuero cabelludo, informe a su técnico en el momento en que está programando, pueden impedir la capacidad del dispositivo para obtener una lectura adecuada de qEEG.
- No use cremas, aceites o geles para el cabello el día de la sesión y asegúrese de que el cabello esté completamente seco antes de venir para el qEEG.
- Use el baño si lo necesita antes del inicio del qEEG porque no podrá detenerse una vez que comience la grabación.
- Planee pasar una hora con el técnico para su sesión de mapeo cerebral.

WWW.NEURON-CONNECT.COM  
TELÉFONO: (602) 888 - 1012  
FAX: (602) 926 - 8333  
BRAINTRAIN@NEURON-CONNECT.COM

